

Расстояние между концами этих отростков.—Entfernung der Spitzen der Proc. postorbitales von einander 114

Наибольшая ширина черепной коробки.—Grösste Breite der Schädelkapsel 112

Ширина морды у кляков.—Breite des Schädels an den Canini 97,5

Ширина верхней челюсти у заднего края хищного зуба.—Breite des Oberkiefers am Hinterrande des Sectorius 127

Ширина между foramina infraorbitalia.—Breite zwischen den Foramina infraorbitalia 88

Ширина между наружными слуховыми отверстиями.—Breite zwischen den äusseren Gehörgängen 44

Ширина носовых костей спереди.—Breite der Nasalia vorne. 65

Длина шва между ними.—Länge der Nasalnaht 101

Отъ заднего края nasalia до передяго края crista.—Vom Hinterrande der Nasalia bis zur Crista 78

Отъ передяго края praemaxillare до верхяго края foram. infraorbitale.—Vom Vorderrande des Praemaxillare bis zum Oberande des Infraorbitalforamens 110

Отъ задяго края алвеолы средяго рѣзца до вырѣзки кости о неба.—Vom Hinterrande der mittleren Schneidezahnalveole bis zur Mitte der Ausbuchtung der Gaumenbeine 155

Отъ foram. palatinum anterius—dito.—Vom Hinterrande des Foram. palatin. anter.—dito 121

Длина ряда верхних рѣзцов.—Länge der oberen Schneidezahnreihe 46

Длина ряда верхних коренныхъ зубов.—Länge der oberen Backenzahnreihe 67

Длина кромки верхяго хищнаго зуба.—Länge des oberen Sectorius (Krone) 35

Ширина его спереди.—Querbreite desselben vorne 20

Кондылярная длина нижней челюсти.—Condylarlänge des Unterkiefers 233

19. *Leopardus pardus tullianus* VALENCIENNES.

Кавказскій барсъ.

Синонимика:

- Felis panthera* und *F. pardus*, RADDE, Säugeth. Talysch. p. 4; Id. Reisen an der pers.-russ. Grenze, p. 4.
- Felis pardus* typ. et var. *tulliana* DEM. et var. *leopardus*, РАДДЕ, Mus. Caucas. I, № 37 b, c, d, стр. 23 и 55—57.
- Felis (Leopardus) pardus tulliana*, САТУНИНЪ, Обзоръ, № 53, стр. 55

Материалы:

- № 37 и 37a, sep., ad. Черена. Мѣст. Джульфы, Эриванской губ., на Араксѣ. 1871. СЕРГЬЕВЪ. Mus. Cauc.
- № 37, b, c, d, 2 ad., 1 juv. Чучела. Ленкорань? РАДДЕ. Mus. Caucas.

Барсъ гораздо многочисленнѣе тигра и спорадически распро-

страненъ по всему Кавказскому краю, доходя на сѣверо-западъ до Кубанской области.

Но въ Талышѣ онъ особенно многочисленъ. Во время своего перваго семинедѣльнаго пребыванія въ Талышѣ, въ 1866 году, Г. И. Радде получилъ 12 свѣжихъ шкуръ этого хищника.

Къ сожалѣнню этотъ изслѣдователь очевидно не считъ нужнымъ привезти хотя бы одинъ черепъ ленкоранскаго барса, и въ музей такового не имѣется.

Отъ поѣздки въ Ленкоранскій уѣздъ покойнаго директора въ музей имѣется въ настоящее время только два старыхъ и одинъ молодой набитые экземпляры. Въ теченіи долгаго времени они стояли открыто (не въ шкафахъ), а потому очень сильно пострадали отъ пыли и выцвѣтанія, а потому и представляютъ весьма ненадежный материалъ для описанія.

Я могу здѣсь замѣтить только, что ленкоранскіе барсы окрашены гораздо ярче, чѣмъ кубанскіе. Это обстоятельство я замѣтилъ на многихъ шкурахъ.

Чтобы дать понятіе о величинѣ закавказскихъ барсовъ, я, за неимѣніемъ череповъ ленкоранскихъ барсовъ, позволю себѣ привести измѣренія череповъ ближайшей къ Талышу мѣстности, именно изъ мѣст. Джульфы, Эриванской губ. на Араксѣ.

Однако я долженъ оговориться, что не убѣжденъ въ тождественности эриванскихъ и талышскихъ барсовъ.

Измѣренія этихъ двухъ череповъ изъ коллекціи Кавказскаго музея полученныхъ отъ г. СЕРГЬЕВА въ 1871 году изъ Джульфы слѣдующія:

Schädelmaasse von <i>Leop. pard. tullianus</i> .	№ 37.	№ 37, a
Общая длина.—Totallänge	255	202
Основная длина.—Basilarlänge	208	173
Скуловая ширина.—Jochbogenbreite	160	133
Наименьшая ширина между орбитами.—Geringste Interorbitalbreite	51	41
Длина верхяго хищнаго зуба (снаружи).—Länge des oberen Sectorius (aussen)	28	25

Такимъ образомъ по величинѣ закавказскіе представители вида *L. pardus* превосходятъ въ величинѣ индійскихъ.

Последніе по Блэнфорду²⁰⁾ имѣютъ слѣдующіе средніе размѣ-

²⁰⁾ The Fauna of British India: Mammalia, by W. T. BLANFORD, p. 68 (1888).

Сатурни К. А. 1905. Млекопитающіе Талыша
 и Музееи Эриванскаго Кавказскаго
 музея в. 2. Вып. 2/4.
 с. 87-89.

ры: основная длина—6,9 дюйм. (=175,26 mm) и скуловая ширина—5 дюйм. (127 mm). Наибольший же череп серии Британского музея, по словам того же автора, имѣетъ всего 8,1 дюйм. основной длины, что равняется 205,74 миллиграммъ, слѣдовательно также, хотя и немного, уступаетъ нашему крупному экземпляру.

Felis catus caucasicus subspec. nov.
Кавказская дикая кошка.

Синонимика:

Felis catus ferus, RADDE, Säugeth. Talysch., p. 5.
Felis catus, RADDE, Mus. Caucas. № 39, 6, стр. 23.

Материалы²²⁾:

№ 39. ♀ Чучело. Мухравань.	IV. 1867. Mus. Caucas.
№ 39a. Чучело. Мухети, Тифл. губ. XII.	1886. Раdde. Ibidem
> с. ♀ Черепъ.	I, 1887. > >
> d. ♂ > Боржомъ, > >	1894. Кратцъ >
> e. > > >	1895. Раdde >
> f. > > >	У. 1896. Вел. Кн. Николай Михайлов.
> g. Шкура. Закаталы, > >	1894. >
> h. > ? > >	? >
> i, k, l (♂) > Батумъ > >	III. 1893. Раdde и Кенигъ >
> n. Чучело. Боржомъ, > >	1897. Раdde >
> o, p. ♀ Чучело и черепъ. Ст. Сторожевая Тер. об. 2. У. 1897. Лоренцъ >	
> q. Шкура. Тифлясь. >	1897. Раdde >
> r. Черепъ. Р. Храмъ, Тифл. губ. >	1897. Калининскій >
> s, t, u, v, w. Черепъ. Боржомъ. >	1898. Ютнеръ >
> x, y, z, aa, bb. Шкура. >	> >
> cc. Шкура и черепъ. Псифъ, Кубан. обл. 1904. Плескъ >	>

Менетрие не приводитъ дикую кошку для Талыша. Раdde говорить, что добылъ одинъ некрупный экземпляръ въ гѣсахъ низменности. Въ музеѣ я нашелъ отъ этого экземпляра, добытаго въ апрѣлѣ 1866 года, только черепъ. Послѣ тщательнаго сравненія его съ большою серіей череповъ дикой и домашней кошекъ, я пришелъ къ убѣжденію, что экземпляръ привезенный Г. И. Раdde изъ Талыша принадлежитъ не дикой, а одичавшей кошке.

Черепъ домашней кошки (*Felis libyca domestica* Brisson) очень похожъ на черепъ дикой (*Felis catus* Linn).

Наиболѣе рѣзкія отличія между ними заключаются въ слѣдующемъ.

²²⁾ № 39, b, «Museum Caucasicum» = *Felis domestica*; № 39, m = *Catolynx chaus*.

У *F. catus* носовыя кости идутъ гораздо далѣе назадъ, чѣмъ восходящая вѣтвь верхнечелюстныхъ костей, а у *F. l. domestica* наоборотъ, дальше назадъ идутъ верхнечелюстные кости. Но у нѣкоторыхъ тифлисскихъ домашнихъ кошекъ я нашелъ, что и носовыя и верхнечелюстные кости оканчиваются къзади на одномъ уровнѣ. Тоже самое видимъ мы и у ленкоранскаго экземпляра. Признакъ этотъ однако не вполне надеженъ, и у многихъ экземпляровъ, добытыхъ въ «Боржомѣ» (т. е. правильнѣе: въ предѣлахъ Боржомской охоты), носовыя кости идутъ назадъ, лишь немного далѣе, чѣмъ верхнечелюстные.

Но у экземпляровъ изъ южной Россіи (Днѣстровскій уездъ) и изъ Германіи признакъ этотъ выраженъ весьма ясно.

Другое, болѣе надежное и сразу бросающееся въ глаза различіе состоитъ въ томъ, что черепъ дикой кошки значительно выпуклѣе, а у домашней нѣсколько приплюснуть и почти совершенно плоскій въ лобной области.

Эта плоская площадка, имѣющая почти ромбическую форму, хорошо выражена и у ленкоранскаго экземпляра; у череповъ же дикихъ кошекъ на нее нѣтъ и намека.

Далѣе, зубы домашней кошки развиты значительно слабѣе.

Это особенно ясно выражено на хищномъ зубѣ. У ленкоранскаго экземпляра онъ имѣетъ лишь 10,3 mm длины, т. е. меньше даже, чѣмъ у средней величины домашней кошки, тогда какъ величина этого зуба у дикихъ кошекъ при одинаковыхъ размѣрахъ черепа, не бываетъ меньше 11, и то только у самокъ.

Что касается приводимаго Блазиусомъ²³⁾ признака, состоящаго въ томъ, что у *F. catus* лобная кость непосредственно примыкаетъ назадъ къ височной, а у *F. domestica* эти кости раздѣляются сходящіяся между собою отростки теменной и клиновидной (*alisphenoid*), то я не нашелъ этого даже и у бывшихъ въ моемъ распоряженіи германскихъ экземпляровъ, напр. у приводимаго здѣсь экземпляра изъ Шварцвальда²⁴⁾. Изъ кавказскихъ же экземпляровъ непосредственное соединеніе между frontale и temporale имѣется только у двухъ экземпляровъ (№ 39 z, ♂ и dd, ♀) изъ Боржома; у всѣхъ же другихъ эти кости раздѣлены сходященіемъ вышеупомянутыхъ отростковъ.

²³⁾ BLASIUS, Die Säugethiere Deutschlands, p. 161 (1857).

²⁴⁾ Этотъ черепъ единственное, что удалось въ Тифлисской таможѣ изъ коллекціи присланной мнѣ проф. Мвзигусомъ.