

АКАДЕМИЯ НАУК СССР — АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ФИЛИАЛ

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ЗИН.

И.3415


Н. К. ВЕРЕЩАГИН

346  
3

КАТАЛОГ ЗВЕРЕЙ  
АЗЕРБАЙДЖАНА

979

904



ИЗДАТЕЛЬСТВО АзФАН  
БАКУ — 1942

Ископаемые остатки найдены в пласте битума, близ Бинагадов на Апшероне (рисс-вюром).

Зона полупустыни, полустепи и низовых лесов. Местообитаниями являются заросли тростника и рогоза по берегам озер и речек, тугай р. Куры и ее притоков до Тбилиси, в Нахичеванской АССР—по Араксу. Отдыхает и выводит детей на заломах камыша, под кустами ежевики и ломоноса. Охотится по преимуществу в сумерках и ночью. Хорошо плавает.

Питается летом рептилиями, птицами, грызунами; зимой—птицами (*Gallinula chloropus*), грызунами (*Arvicola amphibius*). Содержимое желудков: 31/VIII 1938 г., Кизыл Агач—1 экз. *Tropidonotus tessellatus*, обрывки кожи *Nyroca ferina*, 3 экз. *Mus musculus*, в кишках шерсть грызунов. 16/XII 1938 г., Кизыл Агач—1 экз. *Nyroca ferina*; 2/II 1939 г., Каразы—1 экз. *Merula merula*, 2 экз. *Microtus socalis*.

Спаривание в марте; молодых 4—5 экз. в начале мая. Линька в мае, полноценный мех с ноября по март. Вес до 8 кг.

Вреден для дичного хозяйства и птицеводства. В Карагашском зверосовхозе поедает нутрий. Приносит некоторую пользу истреблением вредных грызунов. Заготовки шкурок (в приведенные цифры входят и шкурки лесного кота):

Годы	Колич.	Годы	Колич.
1931	3290	1936	3770
1932	3350	1937	4300
1933	3297	1938	3780
1934	3643	1939	4296
1935	3663	1940	2966

#### 56. Манул—*Otocolobus manul* Pall.

Азерб.—Манул, кюрян пшик

Найден Б. А. Шелковниковым на южном склоне хребта Сарай Булаг в Армении в 1928 году. А. В. Богачев видел убитого манула на ст. Араздаян в 1938 г. Средняя Азия, Иран.


Обитает на каменистых склонах гор. Питается птицами и мышевидными грызунами. Вес до 4 кг.

#### 57. Барс закавказский, леопард, пантера—*Pardus pardus tullianus* Vallenc.

Азерб.—Пеленг, каплан; Арм.—Индз; Лезг.—Роз

Зона высокогорных степей и скал Большого и Малого Кавказа и Талыша. В 1912 г. близ Белокан было добыто

2 барса. Следы барса наблюдались в ноябре 1937 г. у деревьев против г. Закаталы. В 1929 г. была найдена законченная самцом мертвая самка барса близ сел. Хармандали на Мугани. В настоящее время барсы изредка встречаются лишь в горах Нахичеванской АССР и в Талыше. Средняя и Южная Азия, Африка.



Убежищами служат логова под навесами скал, выставленные травой. Охотится в любые часы суток. Пищей служат: тетерева, улары, кабаны, серны, косули, олени. В Нахичеванской АССР—безоаровые козлы и муфлоны. В Талыше—дикобразы и кабаны.

Течка в январе, беременность 3½ мес. Молодых от 2 до 5 апреля. Вес до 80 кг. Опасный хищник, вредный и в охотпромысловом хозяйстве. Заготовлено шкур: в 1937 г.—1, в 1938 г.—1. Добывается ружьем при случайных встречах. Ловля капканами.

#### 58. Рысь кавказская—*Lynx orientalis* Sat.

Азерб.—Вашаг, мешаг, мешь; Арм.—Люсем; Лезг.—Урман мещик

Зона низовых и горных лесов, случайные заходы в зону полупустыни и высокогорных степей. Обитает в ду-