

и 3991

АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ ЗООЛОГИИ

Н. К. ВЕРЕЩАГИН

ОХОТНИЧЬИ
И ПРОМЫСЛОВЫЕ ЖИВОТНЫЕ
КАВКАЗА

1133

553

ИЗДАТЕЛЬСТВО АН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Баку — 1947

наведывается. Убивается из жья при случайных встречах, особенно зимой, и при охотах с собаками на куниц и кабанов.

Черный закавказский кот по взглядам современных крупных зоологов представляет лишь черную форму лесного кота. Однако, нежность меха и сильный блеск его, резко отличают эти экземпляры от обыкновенных лесных котов и создают им совершенно другую ценность в пушной торговле.

Черные коты изредка поступают в заготовку из Алавердинского и Делижанского районов Армении и Закатальского и Нухийского районов Азербайджана в количестве 1—2 шкурки в год.

Живые, да и убитые экземпляры закавказских черных котов с черепом и скелетом представляют несомненно большую научную ценность для выяснения вопроса о видовой самостоятельности этого загадочного еще животного.

В Краснодарском крае встречаются еще нередко дико живущие коты с низким мехом, которых пушники относят к степному ко у. Возможно, что это метисы лесной и домашней кошки.

Степной кот. Называется также пятнистой или хвос-



Рис. 16
Степной кот

татой кошкой. Широко распространен в Иране, Афганистане и Средней Азии. На перешейке он встречается до-

вольно редко в прикуринских степях Азербайджана и по долине Аракса в Нахичеванской АССР и Армении; где до сих пор ходит, вероятно, до Лениакана. Добывается эта кошка в кажда, попутно с лисицей и камышевым котом в количестве 3—4 штук в Азербайджане и 2—3 штук в Армении.

Камышевый кот или камышевая рысь. Обитает в приречных кустарниках и камышах Сулака, Терека, Кумы, в низменном Дагестане, по всей низменной части В. Закавказья до Сурамского хребта на запад и по долине Аракса в Армении. Далее его ареал уходит в Среднюю и Южную



Рис. 17
Камышевый кот

Азию. Особенно много этих котов обитает в Хачмасской и Ленкоранской низменности Азербайджана, а также по долине р. Алазани. В горы не поднимается выше 800 м. Кот этот вообще является наиболее многочисленным из всех видов кошек, поступающих в заготовку, и в то же время — это серьезный вредитель птицеводства. Шкурка выходная, с ноября по март.

Манул. Эта небольшая рыжая кошка обитает в пустынях Туркмении и в Афганистане. В 1928 году один экземпляр манула был добыт на южном склоне хребта Сарайбулах у долины Аракса на границе Армении и Нахичеванской АССР.

Барс или леопард. В настоящее время на Кавказе почти истреблен. Различные расы этой крупной кошки широко распространены в Африке и в южной половине Азии. На Кавказе он проник с юга и немного

численные экземпляры живут теперь по преимуществу в западной части Главного хребта на Загтезурском хребте в Нахичеванской АССР и в Талыше. За последнее десятилетие на перешейке было добыто при случайных встречах




Рис. 18
Барс

всего около десятка барсов. Шкурка барса, даже летняя, используется теперь на украшение, как ковровый товар.

Тигр. Широко распространенный еще в прошлом столетии тигр по камышам и джунглям южного побережья Каспия в Средней Азии, Приморье и в Индии, может считаться к настоящему времени истребленным на Кавказе. Последние известные экземпляры были убиты под Тифлисом в 1922 году и в Талыше в 1932 году. За последнее десятилетие неизвестно ни одной встречи тигра, но случайные заходы из северного Ирана возможны и сейчас. Каждый живой экземпляр тигра представляет большую ценность для зоопарков.

Рысь. Распространена на перешейке повсеместно, где сохранились еще значительные массивы леса. Близкие рай-

оны обитают в лесах Европы (Северной, Средней и Малой Азии, Великой и вертикальное распространение этой пестрой кошки. Она встречается как близ урвонья моря в Ленкоранской, Хачмакской и Колхидской низменностях, так и на альпийских лугах и высокогорных рощах скал в центральном Дагестане, заходя сюда из зоны горного леса. Наибольшее количество рысей попадает в заготовку с Триагетского хребта в Грузии, с север-восточных отрогов Большого Кавказа в Кубинском и Дивичинском районах Азербайджана.

Теплая и пушистая шкура рыси весьма ценится в меховой торговле и идет на подбивку пальто, на воротники, шапки. Мясо рыси отличается нежностью и весьма вкусно, но нигде на Кавказе в пищу не употребляется.

Добывают здесь рысь почти исключительно в сильные качканы с мясной приманкой. Во время охот с гончими по косулям собаки загоняют иногда рысей на деревья или на скалы и тогда они попадают под выстрел.

Заяц-русак. Распространен по Южной и Средней Европе и Малой Азии. На Кавказе представлен двумя формами: более крупным — северокавказским и более мелким — закавказским или куринским русаком. Обитает он на перешейке всюду, за исключением больших сплошных массивов горного и низового леса, а также участков совсем ровных и бедных растительностью полупустынь.

Особенно много зайца в предгорной полосе Северного Кавказа и в освоенных под хлопок и зерновые участках прикуринских степей в Азербайджане. В болотистых и лесистых районах западной Грузии зайца совсем мало. Также мало зайца и на высокогорных лугах, где его размножение, вероятно, тормозится суровыми условиями.

Шкурка русака, помимо массового использования в качестве дешевой пушилки, идет на выделку фетра и выварку клея. Много зайчих шкур оседает и на местах, так как население охотно употребляет их в невыделанном или плохо выделанном виде на коврики, шапки, воротники, а нередко и просто выбрасывает вследствие низких заготовительных цен. В теплых низменностях Кавказа шкурки взрослых зайцев бывают выходными с конца ноября до половины февраля. Но для всей массы шкурки эти сроки негодны из-за обилия подрастающего молодняка, так как размножение зайца идет здесь круглый год, даже и на Северном Кавказе. Горные зайцы размно-