



MUSEUM
CAUCASICUM.

I

КОЛЛЕКЦІИ КАВКАЗСКАГО МУЗЕЯ

обработанныя совместно съ учеными специалистами

и

изданныя

Др. Г. Н. Радде

Директоръ Кавказскаго музея и Публичной библиотеки въ Тифлисѣ,
Почетнымъ членомъ-корреспондентомъ Королевскаго Географическаго общества въ Лондонѣ,
Почетнымъ членомъ Географическихъ обществъ въ Берлинѣ, Дрезденѣ, Будапештѣ, Амстердамѣ и т. д.
Членомъ-корреспондентомъ Имп. Академіи Наукъ и Имп. Геогр. общества въ С.-Петербурѣ.

ТОМЪ I.

ЗООЛОГІЯ.

СОСТАВИЛЪ

Др. Г. Н. Радде.

×

Съ 5 порцеттами, 24 таблицами фототипій и литографій и 2 картами.

ТИФЛИСЪ.

Типографія Канцеляріи Главноначальствующаго гражданскаго частію на Кавказѣ.

1899.

ВЪИМПЕРАТОРСКОМУ ВЪИСОУЩЕСТВУ

DIE SAMMLUNGEN

DES

KAUKASISCHEN MUSEUMS

IM VEREINE MIT SPECIAL-GELEHRTEN BEARBEITET,

und

HERAUSGEGEBEN

VON

Dr. Gustav Radde

Director des Kauk. Museums und der öffentl. Bibliothek in Tiflis,
Ehrenmitglied (horr.) der Kgl. Geographischen Gesellschaft in London,
Ehrenmitglied der Geographischen Gesellschaften von Berlin, Dresden, Budapest, Amsterdam, ect., ect.
Korrespondirendes Mitglied der Kais. Akademie der Wissenschaften
und der Kais. Geographischen Gesellschaft in St.-Petersburg.

BAND I.

ZOOLOGIE

VON

Dr. Gustav Radde.

mit 5 Portraits, 24 Tafeln Phototypen und Lithographien und 2 Karten



TIFLIS.

Typographie der Kanzlei des Landeschefs.

1899.

РАН
БИБЛИОТЕКА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
117903, ГСП-1, г. Москва,
Ленинский пр-т, 33

Библиотека биологическая
Института АН СССР
Москва, Ленинский пр-т, 33

35. Научное наследие России

MAMMALIA.

МЛЕКОПИТАЮЩІЯ.

SÄUGETHERE.

Шкапъ—42, 43, 53, 53 ¹⁾—Schrank.
и открыто поставлено—und frei aufgestellt.

Съ того времени область распространения тигры сильно сократилась по направлению къ юго-востоку. Барсъ же (*F. pardus* L.), какъ мы сейчас увидимъ, удержалъ свою область распространения по направлению къ сѣверо-западу съ большимъ постоянствомъ. Всѣ извѣстия о случаяхъ нахождения тигра въ русскихъ предѣлахъ внѣ Талыша, сообщенные мнѣ частно или напечатанные въ мѣстныхъ газетахъ, которые можно было изслѣдовать, оказывались ложными, и въ основѣ ихъ обыкновенно лежало смѣшеніе тигра съ барсомъ ¹⁾.

На востокѣ вдоль берега Каспійскаго моря, именно на береговой полосѣ Гѣзъ, около Астрабада тигръ весьма обыкновененъ и снова встрѣчается въ Закаспійской области въ слѣдствіе обилия кабановъ и камышевыхъ зарослей вдоль большихъ рѣкъ. Въ 1886 году мы встрѣтили его у Теджена. Одна, происходящая оттуда шкура, № 36, d, принадлежитъ къ длинноволосой разновидности (*F. tigris longipilis* Fitz.). Что между талышинскими тиграми встрѣчаются и очень крупныя экземпляры доказываетъ черепъ подаренный кавказскому музею княземъ Витгенштейномъ. Этотъ экземпляръ, № 36, b, былъ убитъ около Беласу-вара, слѣдовательно на краю Мугани, вблизи сѣверной подошвы Талышинскихъ горъ.

Наибольшая основная длина черепа отъ задняго края затылочнаго отверстія до передняго края верхней челюсти 36,5 ст.

Наибольшая ширина скуловыхъ дугъ 27 ст. Р.

№ 37. *Felis pardus* L. typ. et var. *tulliana* Dem. et var. *leopardus* L. Барсъ ²⁾

Не легко найти между кавказскими барсами два совершенно одинаковыя и по цвѣту и по рисунку экземпляра. Къ такому выводу по крайней мѣрѣ пришелъ я по отношенію ко многимъ шкурамъ, которыя прошли черезъ мои руки. На среднемъ Араксѣ въ узкомъ ущельѣ внизъ отъ сел. Мигры я видѣлъ крупныя экземпляры въ лѣтней шерсти, основная окраска которыхъ была грязновато-свѣтло-желтая. Самые темныя экземпляры изъ другихъ мѣстностей имѣютъ основной тонъ свѣтлый буро-желтый. Ни рисунокъ колець, ни большая или меньшая сомкнутость составляющихъ ихъ дугообразныхъ пятенъ, ни форма пятенъ не представляютъ ничего постояннаго. У болѣе молодыхъ животныхъ центральная пятна въ кольцахъ имѣютъ размытый сѣрый цвѣтъ. Я не знаю рѣзко выраженный переходъ къ леопарду съ Кавказа, но знаю его изъ Закаспійской области. У г. полковника Вестмана въ Астрабадѣ я видѣлъ прекрасную шкуру (1886 г.), и, такъ какъ мнѣ не соглашались ее уступить, срисовалъ ее. Основной тонъ былъ сверху довольно темный, на бокахъ становился свѣтлѣе и постепенно переходилъ въ чисто бѣлую окраску нижней стороны.

Барсъ, хотя и не осыдо, а кочуя, и не въ большомъ числѣ, живетъ по всему Кавказу за исключеніемъ большихъ равнинъ и степей. Его мѣстонахожденіе ни въ какомъ случаѣ не зависитъ отъ лѣсовъ, но въ гораздо большей степени отъ богатства мѣстности крупными животными, составляющими его пищу. На среднемъ Араксѣ барсы живутъ въ безводныхъ горныхъ скалистыхъ горахъ только потому, что тамъ водятся много бородатыхъ козловъ, которыхъ они подстерегаютъ на водоофѣ у рѣки. Барсъ обитаетъ въ обширномъ полѣѣ отъ уровня моря до вѣчныхъ снѣговъ, т. е. отъ 0 до 10—12000', и лѣтомъ слѣдуетъ за домашнимъ скотомъ и за часто большими стадами горныхъ козловъ на альпійскіе луга. Преслѣдуя тѣхъ и другихъ, они спускаются зимою внизъ по долинамъ и, побуждаемые голодомъ, нерѣдко посѣщаютъ населенія человѣка.

¹⁾ Таково было сообщеніе въ „Охотнич. Газетѣ“ за 1896 годъ. „О тигрѣ въ Сальвахъ“. Оно было перепечатано и во всѣхъ мѣстныхъ газетахъ по обыкновенно бѣло излож. критикѣ. Подите и познакомьтесь съ г. офицеромъ убившимъ этого „тигра“. Отъ него я узналъ, что это былъ барсъ, шкуру и черепъ котораго онъ мнѣ и показал.

См.

²⁾ Я перевожу по русски *F. pardus* (cum synonym) — „барсъ“, такъ какъ это имя общепринятое для обозначенія этого животнаго на Кавказѣ.

См.

Въ началѣ пятидесятихъ годовъ одинъ барсъ былъ пойманъ въ Кавказѣ даже у Тифлиса (генераль Кесслеръ), и показаніе Нордмана ¹⁾, что въ 1835 году около Тифлиса былъ убитъ тигръ, но всёмъ вѣроятіемъ должно быть отнесено къ барсу же. Нахожденіе барса было неоднократно доказано по обѣ стороны Главнаго Кавказскаго хребта отъ 0 до высоты свыше 10000', по меридіану Туапсе, лежащаго на берегу Чернаго моря, окрестности котораго одинъ барсъ тревожилъ въ 1893 году, повидимому представляеть западную границу этого хищника. О нахожденіи его около Новороссійска и Анапы—я не получилъ свѣдѣній. Нужно замѣтить, что восточнѣе этого меридіана вершины Главнаго хребта быстро поднимаются и уже на Финтѣ и Оштенѣ достигаютъ слѣговой линіи, здѣсь встрѣчаются и большія стада горныхъ козловъ.

На Сѣверномъ склонѣ въ охотничьихъ угодьяхъ **Е. И. Выс. Вел. Кн. Сергія Михайловича** въ послѣдніе четыре года было добыто 8 барсовъ. Осетинамъ тоже хорошо знаютъ этого звѣря. Въ восточномъ Дагестанѣ, въ горахъ Салатау я не могъ получить о нихъ свѣдѣній, но тамъ и туры были рѣдки. Напротивъ доказано, что въ зиму 1881—82 года около Маюръ-Туна въ 3-емъ участкѣ Грозненскаго округа барсомъ былъ растерзанъ въ лѣсу человекъ. Въ чрезвычайно высоко расположенномъ на подножьи высокихъ горъ Шахъ-дагъ и Базаръ-дюзъ въ аулѣ Курушъ (8200') лезгини знали барса по имени, но не могли указать ни одного достовернаго случая о появленіи его здѣсь въ позднѣйшее время. На южной сторонѣ Главнаго хребта барсъ повидимому всего многочисленнѣе въ центральной части, именно въ долинѣ Алазани. Много разъ были убиваемы барсы около Загаталя, Лагодехъ, Нухи и въ Бумскомъ ущельи.

О нахожденіи барса далѣе на западъ въ Колхидской области у меня есть нѣкоторыя данныя. Когда въ 1864 году я въ первый разъ прибылъ въ высокія продольныя долины Коахиды, то какъ вольные, такъ и дадановскіе сванеты (Шигуръ, Цхенисл-цхали) знали это животное. Послѣдніе называли барса „вѣбхъ“, а также „цицъ“;—послѣднее значить просто „понка“,—и знали, что два барса были убиты въ 1862 году въ долинѣ Сена. Они жаловались, что зимою барсы растерзываютъ ихъ скотъ. Въ Лашветахъ, въ самомъ нижнемъ селеніи на источкѣ Гиппоса, передъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ онъ сворачиваетъ на югъ къ тѣсному ущелью Мури, знали только имя этого животнаго, но ни одного случая его появленія здѣсь. Въ нижней Мингрелии, а также въ береговой полосѣ Абхазіи случаи появленія барса очень рѣдки, однако мѣстные жители, напр. въ Джвари знаютъ его, какъ животное держащееся на высокихъ горахъ. Въ 1861 году одинъ барсъ былъ убитъ у Бзыба. Въ Абхазіи его называютъ „альмъ“. Относительно появленія барса въ Сочи, я знаю два случая; въ 1875 году барсъ попалъ на рабочаго, спавшаго на открытомъ воздухѣ, тяжело поранилъ ему затылокъ и хотѣлъ унести; рабочій этотъ былъ спасенъ и лечился въ госпиталѣ (Гарбе, Гротъ). Мы имѣемъ точныя свѣдѣнія относительно единичнаго появленія барса на горахъ составляющихъ водораздѣлъ между Курюю и Риономъ, въ прибрежной Понтійской цѣпи, и во всемъ Маломъ Кавказѣ отъ Триалетскихъ горъ, черезъ Ганджинскія горы до Карабаха. Въ мѣстѣ Боржомъ за послѣднее десятилѣтіе въ охотничьемъ паркѣ было охвачено три барса. Относительно Аракса я имѣю точныя свѣдѣнія о нахожденіи барса около Кудльи и въ упомянутомъ уже выше узкомъ ущельи, которое начинается у Ордубата и тянется вдоль самаго обрывистаго склона Карабахскихъ горъ. Но всего

¹⁾ О необыкновенныхъ мѣстоахожденіяхъ животнаго можно собственно сообщать только тогда, когда самъ видѣлъ это животное. Я самъ неоднократно могъ убѣдиться въ томъ, что извѣстіе о томъ, что былъ добытъ тигръ, съ большою вѣроятностію должно быть отнесено къ барсу. Извѣстія по слухамъ почти вовсе нельзя принимать къ свѣдѣнію. Р.

чаще встречающемся и нашелъ барса опять-таки въ Талышѣ. Когда въ 1866 году, во время моего семинедѣльнаго тамъ пребыванія, я общалъ хорошія цѣны, то мнѣ принесли въ теченіи этого времени 12 сѣбкихъ, правда частью испорченныхъ шкуръ. Р.

№ 39. *Felis catus* L. Дикій котъ. Отъ уровня моря до границы лѣсовъ. Находящаяся предо мною шкура изъ разныхъ мѣстъ Кавказа не представляетъ никакихъ значительныхъ отличій въ окраскѣ. Большинство имѣетъ основной фонъ сѣрый съ сильною желтизною. Только одинъ экземпляръ изъ Закавказья болѣе чистаго сѣраго цвѣта; это крупный котъ, имѣющій длину отъ конца носа до основанія хвоста 69 ст., и длину хвоста съ концевыми волосами 34 ст. Чаще всего и притомъ наиболѣе крупные дикіе коты встрѣчаются въ лѣсахъ Аджарин. Объ этомъ говорятъ уже большее число ихъ шкуръ, представлявшихъ зимнюю добычу 1892—93 года, которыя я просматривалъ въ лавкахъ Батума, и изъ которыхъ нѣсколько себѣ выбралъ. Дикая кошка встрѣчается на Кавказѣ всюду, гдѣ есть лѣса, но чаще всего въ среднемъ поясѣ горъ. Одиачили домашнія кошки съ окраскою дикихъ попадаются не часто. № 39 а. Наоборотъ бродячія кошки различной окраски обыкновенны въ долинахъ, въ охотничьихъ районахъ.

Въ Лентехи (Дадіановская Свагетія) въ концѣ іюня у домашнихъ кошекъ былъ самый разгаръ любовной поры. Р.

№ 40. *Felis* sp. Величною съ длиною кошку, смоляно-чернаго цвѣта, иногда съ разбросанными бѣлыми волосами ости. Мѣхъ лучшаго достоинства. Во многихъ мѣстахъ охотники считаютъ эту кошку дикимъ животнымъ. Она водится не только на Кавказѣ но и въ Закаспійской области, напр. на верхнемъ Тедженѣ. Мы имѣемъ только неполныя шкуры. Экз. изъ Шаръ-Аризли имѣетъ небольшую примѣсь желтыхъ волосъ.

№ 41. *Felis chaus* Güld. Живетъ преимущественно въ низменностяхъ восточнаго Кавказа, именно въ хорошо орошенныхъ мѣстностяхъ, особенно въ заросляхъ камыша и ежевики (*Rubus*), какъ на сѣверной, такъ и на южной сторонѣ Главнаго хребта, но чаще всего въ южной части каспійскаго побережья. Это главный врагъ зайцевъ, а также фазановъ и другой пернатой дичи. Въ вертикальномъ направленіи его распространеніе съ достовѣрностью доказано только приблизительно до 2000' (долина Куры). Напр. его нѣтъ уже въ Боржомѣ (2600'). Съ западнаго Кавказа у меня нѣтъ точныхъ свѣдѣній.

№ 44. *Felis lynx cervaria* Tem. Рысь. 0'—8000'? Типичную сѣверную рысь я ни разу не видалъ на Кавказѣ, хотя и просматривалъ въ мѣховыхъ лавкахъ многія сотни шкуръ. Всегда здѣшняя рысь значительно меньше и иногда сильно испещрена. Основной фонъ на спинѣ и бокахъ колеблется отъ свѣтло-каштановаго до желтовато-сѣраго (Дагестанъ). Продольные ряды пятенъ, идущіе на обоихъ бокахъ параллельно средней линіи спины, иногда сливаются и образуютъ продольныя полосы. На лѣтней шерсти пятнистость видна всего яснѣе и часто имѣетъ рѣзкую границу; наоборотъ у молодыхъ она выражена очень слабо, иногда едва замѣтна. При желаніи можно отдѣлать какъ отдѣльный видъ кавказскую рысь отъ типичной съ такимъ же правомъ, какъ это сдѣлано по отношенію къ нѣкоторымъ другимъ видамъ кошекъ. Однако и въ этомъ случаѣ такой такъ называемый видъ не можетъ быть рѣзко обособленъ и отличительные его признаки не во всѣхъ случаяхъ будутъ ясны. Хорошія зимнія шкуры цѣнятся дорого. Въ Дагестанѣ спрашивали за такую 10 руб., обыкновенно же онѣ цѣнятся въ 3—4 рубля.

№№ 42, 43, 45. *Felis caudata* Gray, *F. caracal* Güld. и *Cynaelurus jubatus* Schreb. Я могу привести только для Закаспійской области и именно низменныхъ мѣстностей; на Кавказѣ они никогда не были найдены. Р.

№ 46. *hyaena striata* Zimm. Въ теченіи болѣе чѣмъ 30 лѣтъ мнѣ было прише-