

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова  
Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова  
Териологическое общество при РАН



# ТЕРИОФАУНА РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

(VIII съезд Териологического общества)

Материалы международного совещания

31 января –2 февраля 2007 г., г. Москва

Товарищество научных изданий КМК

Москва ♦ 2007

## ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС ЛЕОПАРДА, *PANTHERA PARDUS* (*CARNIVORA, FELIDAE*) КАВКАЗА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Хорозян И.Г.<sup>1</sup>, Барышников Г.Ф.<sup>2</sup>, Абрамов А.В.<sup>3</sup>

Зоологический институт РАН, Университетская наб. 1, Санкт-Петербург 199034,  
Россия, leopard\_am@yahoo.com<sup>1</sup>, ursus@zin.ru<sup>2</sup>, aav@aa2510.spb.edu<sup>3</sup>

Для Передней Азии отмечены девять подвидов леопарда: аравийский или южно-аравийский *Panthera pardus nimr* (Hemprich & Ehrenberg, 1833); анатолийский или малоазиатский *P. p. tulliana* (Valenciennes, 1856); кавказский *P. p. ciscaucasica* (Satunin, 1914); персидский или северо-персидский *P. p. saxicolor* Pocock, 1927; синдский или белуджистанский *P. p. sindica* Pocock, 1930; кашмирский *P. p. millardi* Pocock, 1930; синайский *P. p. jarvisi* Pocock, 1932; центрально-персидский *P. p. dathei* Zukowsky, 1959 и южнокавказский *P. p. transcaucasica* Zukowsky, 1964. Мы измерили музейные экземпляры и проанализировали литературные данные по 24 параметрам и 3 индексам у 40 черепов, происходящих из данного региона. Мы использовали дискриминантный анализ для разделения 7 групп из Северного Кавказа, Южного Кавказа, Туркменистана, Ирана, Турции, Пакистана и Аравии с более чем 90% вероятностью правильной классификации по группам. Были получены пять сценариев распределения черепов по группам, которые показали идентичность леопардов из Кавказа и Туркменистана и их вероятную идентичность с особями из северного Ирана, близость леопардов из южного Ирана и Пакистана и из Турции и Синайского полуострова и четкую обособленность леопарда из Турции и Аравии от всех других групп. В соответствии с правилом приоритета зоологической номенклатуры, мы предлагаем закрепить названия *P. p. ciscaucasica* (=*saxicolor*, *transcaucasica*) для Кавказа, Туркменистана и северного Ирана, *P. p. sindica* (=*dathei*) для южного Ирана и южного Пакистана и *P. p. nimr* для Аравийского полуострова. Подвид *P. p. millardi*, вероятно, является синонимом *P. p. sindica* и его статус должен быть выяснен на дополнительном материале. Таксономическое положение *P. p. jarvisi* может быть уточнено после сравнения с номинативным подвидом *P. p. pardus* из Египта.