

Бирмане А.А. 1912. Млекопитающие в систематике ч  
Российской империи  
Herpestoidea. 14. Слоник, седошник  
Н.А. Зарудный в Персии в  
1896, 1898, 1900-1901 и 1903-1904 гг.  
Емелюк Иванъ Ивановичъ  
Бюффонъ Коже  
Г. П. Савинъ  
И.Н. Рудницка,  
с. 209-210  
Самое прекрасное  
Томъ 1-й

Сем. Felidae.

Въ коллекціи Н. А. Заруднаго сем. *Felidae* представлено только однимъ видомъ, *Felis ornata* GRAY, но въ его отчетахъ, особенно о путешествіи въ Белуджистанъ въ 1898 г., имѣются свѣдѣнія и о другихъ видахъ кошекъ:

*Felis (Leopardus) pardus* L. — въ юго-восточной Персїи леопардъ, очевидно, не представляетъ рѣдкости, такъ какъ Зарудный неоднократно видѣлъ слѣды этой кошки, наблюдалъ также и самого звѣря; эти наблюденія относятся къ его путешествію въ пров. Кирманъ; леопардъ встрѣченъ имъ въ Саргадѣ, Худиянѣ, также близъ Базмана и въ странѣ Бампуръ. По указанію Блэнфорда, леопардъ отсутствуетъ только въ нѣкоторыхъ частяхъ Синда и въ Пенджабѣ, въ горахъ-же Синда и въ англійскомъ Белуджистанѣ онъ обыкновененъ; во всей южной и центральной Персїи леопардъ также не представляетъ рѣдкости. Въ отчетахъ Заруднаго я не нахожу однако указаній, чтобы эта кошка встрѣчалась ему въ Сеистанѣ и Хорассанѣ; есть, впрочемъ, основаніе думать, что по крайней мѣрѣ въ болѣе западныхъ частяхъ Хорассана леопардъ водится; за это говоритъ то обстоятельство, что изъ Закаспійской обл. имѣются въ коллекціяхъ экземпляры — напр., въ коллекціи Зоологическаго Музея имѣется экземпляръ, добытый въ горахъ Бол. Балханы. Персидскій районъ распространенія леопарда, такимъ образомъ, непосредственно связанъ съ индійскимъ; однако по указанію Блэнфорда<sup>1)</sup> леопардъ, водящійся въ Белуджистанѣ и Синдѣ, представляетъ рассу, по крайней мѣрѣ, въ отношеніи окраски отличную отъ индійской пантеры, именно общій тонъ его окраски свѣтлѣе, чѣмъ у индійской рассы; Блэнфордъ говоритъ, что леопардъ, обитающій Белуджистанъ и Синдъ, „differs widely from all the others and is quite intermediate in coloration and spotting between the leopard and the ounce, the resemblance to the latter being increased by the long fur and thick hairy tail“. Сходство персидскаго леопарда съ ирбисомъ (*Felis irbis*

1) W. BLANFORD, Mammalia in: The Fauna of British India etc., 1888, p. 69.

Енрв. = *Felis uncia auctororum*)<sup>2)</sup> чисто вѣшнее и неглубокое, такъ какъ по краниологическимъ признакамъ *Felis irbis* достаточно рѣзко отличается отъ видовъ группы леопарда (*Felis pardus*, *F. onca*, *F. concolor*); ввиду сказаннаго включеніе ирбиса въ персидскую фауну слѣдуетъ считать основаннымъ на смѣшеніи его съ свѣтло окрашенной Блэнфорда, что леопарда. По всей вѣроятности мнѣніе Блэнфорда, что леопарды Белуджистана и Синда принадлежатъ къ подвиду *tullianus* VALANS., описанному впервые изъ Малой Азїи (окр. Смирны) и по современнымъ даннымъ распространенному до сѣвернаго склона Кавказа (Кубанская обл.), справедливо; всѣ видѣнные мной экземпляры леопарда изъ Зап. Персїи и Закаспійской обл. также должны быть отнесены къ этому подвиду.

*Felis* sp. — въ горахъ по р. Рудъ-и-Каскинъ между Базманомъ и Бампуромъ Зарудный нерѣдко видѣлъ слѣды какой-то большой кошки, о которой онъ говоритъ, что „судя по слѣдамъ, она должна быть крупнѣе каракала (*Felis caracal*)“<sup>3)</sup>.

*Cynaelurus jubatus* (SCHNEIDER) — гепардъ былъ найденъ Заруднымъ въ Белуджистанѣ на р. Рудъ-и-Каскинъ близъ Бампура и въ Саргадѣ (Шуръ-абъ).

2) Бюффонъ (Buffon, Hist. natur., 1761, vol. IX, p. 151—152, pl. 18) впервые изобразилъ и описалъ „la petite Panthère d'Oppien (De venatione lib. III), à laquelle Anciens n'ont pas donné de nom particulier, mais que les Voyageurs modernes ont appelé Once“; по его свѣдѣніямъ (l. c., p. 164) эта кошка живетъ въ Персїи и дрессирована для охоты. На таблицѣ 18 изображенъ по своему общему виду настоящій леопардъ, только узоры на его бокахъ отчасти напоминаютъ ирбиса; первое биномиальное названіе далъ этой кошке Шреверъ (Schreber, Die Säugethiere etc., 1778, S. 386, Taf. 100), назвавъ ея *Felis uncia*; однако, основаніемъ для Шревера послужили данныя Бюффона; даже приводимый имъ рисунокъ представляетъ раскрашенную копию съ рисунка Бюффона; Блэнфордъ (Eastern Persia, vol. II, p. 35) пишетъ: „i have seen ounce skins in London said to have been brought from Persia“; Свентъ-Джонъ (l. c.) добавляетъ къ этому: „an ounce's skin was brought to me at Shiráz, said to have been obtained in the neighbouring hills“; вотъ и всѣ данныя, на основаніи которыхъ включаютъ ирбиса въ фауну Персїи; сомнительное значеніе этихъ данныхъ настолько очевидно, что считать доказаннымъ принадлежность ирбиса къ персидской фаунѣ ни въ коемъ случаѣ нельзя; вмѣстѣ съ тѣмъ колеблется и предположеніе, что „once“ Бюффона есть ирбисъ. Возможно, что *Felis uncia* SCHNEIDER представляетъ лишь синонимъ (съ правомъ приоритета) *Felis tulliana* VALANCIENS.

3) Н. А. Зарудный, Зап. Имп. Русс. Геогр. Общ., XXXVI, стр. 232.